


IL TRATTAMENTO DELLA CRISI IPOGLICEMICA

Trattare l'ipoglicemia è relativamente semplice. In generale possiamo avere due casi:


1° CASO IL BAMBINO E' ANCORA COSCIENTE




- 1) Prima di tutto si esegue il test
- 2) A seconda del valore della glicemia riscontrato, si somministra zucchero ad assorbimento veloce, in base allo schema terapeutico individuale (per esempio le normali bustine di zucchero). Questa prima assunzione di zucchero dovrebbe in pochi minuti far scomparire tutti i sintomi clinici
- 3) A questo punto il bambino ha bisogno di riposo
- 4) 10-15 minuti dopo, (se ipoglicemia è avvenuta entro 3 ore dalla somministrazione di insulina), è opportuno uno spuntino a base di zuccheri a lento assorbimento (pane, crackers), sempre seguendo le indicazioni dello schema terapeutico
- 5) Occorre quindi fare una misurazione della glicemia per essere certi che sia tornata ai valori normali

II° CASO: IL BAMBINO E' IN UNO STATO DI INCOSCENZA OPPURE NON E' NELLA CONDIZIONE DI DEGLUTIRE


- 1) Non somministrare zucchero per bocca.
- 2) Non è indispensabile misurare subito la glicemia, perché è più urgente la somministrazione della terapia
- 3) Posizionare il bambino in posizione laterale di sicurezza
- 4) Chiamare 118 e genitori
- 5) Le persone che hanno a che fare con un bambino diabetico (familiari, amici, insegnanti ecc...) dovrebbero imparare la tecnica dell'iniezione del glucagone




appena possibile!



IL BAMBINO CON DIABETE
Può e deve poter fare tutto quello che fanno gli altri bambini: ha soltanto necessità di qualche semplice attenzione in più.



DIABETE
È una malattia metabolica in cui, per carenza di **INSULINA**, si hanno valori elevati di **GLICEMIA** (zuccheri nel sangue)




L'INSULINA
non prodotta dal pancreas viene quotidianamente iniettata al bambino prima di ogni pasto tramite diversi dispositivi.

MISURAZIONE GLICEMIA
Il bambino diabetico necessita di frequenti controlli della glicemia: lo strumento utilizzato è il glucometro



IPERGlicEMIA quando i valori di zucchero nel sangue superano i 300 mg/dl. Una condizione di iperglicemia saltuaria non è pericolosa. In questo caso fare bere molta acqua al bambino, consentirgli di andare in bagno, lasciarlo tranquillo ed esonerarlo quel giorno dall'attività fisica.

IPOGLICEMIA LIEVE
si corregge con l'assunzione di alimenti o bevande zuccherati.
IPOGLICEMIA GRAVE
Non vanno somministrati alimenti o bevande ma il bambino va messo nella posizione laterale di sicurezza, attivato il 118, avvisata la famiglia e somministrato il glucagone



IPOGLICEMIA quando i valori di zucchero nel sangue sono inferiori a 70 mg/dl.
Sintomi comuni sono: stanchezza, fame, tremore, sbalzi d'umore, sudorazione, più frequenti prima del pranzo o dopo intensa attività motoria.

IL BAMBINO CON DIABETE

